

Instrukcja przygotowania do gastroskopii w Przychodni Bodyclinic

- Na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
- Na 6 godzin przed badaniem można pić TYLKO wodę.
- Na 2 godziny przed badaniem nie należy NIC pić, palić papierosów, żuć gumy.
- Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.

Informacja o przyjmowaniu leków przed badaniem endoskopowym

- Osoby **regularnie przyjmujące** leki (np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby serca, padaczki, astmy itp.) **w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku** popijając niewielką ilością wody - **nawet jeśli badanie wykonywane jest w znieczuleniu.**
- Osoby **chorujące na cukrzycę** powinny **skonsultować sposób przygotowania do badania z lekarzem** prowadzącym. **Nie należy przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych, jeśli równocześnie nie są spożywane pokarmy.**
- Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi:
 - **nie odstawić** preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. **Acard, Polocard, Acesan**),
 - leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (**Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana**) - **należy odstawić w dniu poprzedzającym oraz pominąć poranną dawkę leku w dniu badania.**
 - leki z grupy doustnych antykoagulantów (**Acenokumarol, Warfaryna**) – należy postępowanie **skonsultować z lekarzem.**
- **Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią** powinny **skonsultować z lekarzem** prowadzącym sposób przygotowania do badania.
- **Na 2 dni przed wyznaczonym badaniem należy odstawić preparaty żelaza.**