

Instrukcja przygotowania do gastrokopii

W Przychodni Bodyclinic



- Na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
- Na 2 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
- Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.

Informacja o przyjmowaniu leków przed badaniem endoskopowym

- Osoby **regularnie przyjmujące** leki (np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby serca, padaczki, astmy itp.) **w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku** popijając niewielką ilością wody - **nawet jeśli badanie wykonywane jest w znieczuleniu.**
- Osoby **chorujące na cukrzycę** powinny **skonsultować sposób przygotowania do badania z lekarzem prowadzącym. Nie należy przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych, jeśli równocześnie nie są spożywane pokarmy.**
- Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi:
 - **nie odstawiać** preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. **Acard, Polocard, Acesan**),
 - leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (**Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana**) - **należy odstawić w dniu poprzedzającym oraz pominąć poranną dawkę leku w dniu badania.**
 - leki z grupy doustnych antykoagulantów (**Acenokumarol, Warfaryna**) – należy postępowanie **skonsultować z lekarzem.**
- **Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią** powinny **skonsultować z lekarzem prowadzącym** sposób przygotowania do badania.
- **Leki z grupy analogów GLP-1 (Ozempic, Mounjaro, Trulicity, Rybelsus)** powinny zostać **odstawione co najmniej 14 dni przed badaniem.**
- **Na 2 dni przed wyznaczonym badaniem należy odstawić preparaty żelaza.**

W CIĄGU 12 GODZIN PO ZNIECZULENIU OGÓLNYM NIEDOZWOLONE JEST:

- prowadzenie samochodu i innych pojazdów oraz obsługa skomplikowanych urządzeń i maszyn
- picie alkoholu,
- wykonywanie innych czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej